

ЛЕВОФЛОКСАЦИН, 100 МГ, С ЛИНИЕЙ РАЗЛОМА, ДИСПЕРГИРУЕМЫЕ ТАБЛЕТКИ

Рекомендуемые дозы: 15-20 мг/кг/в день

Дозы в расчете на вес

Вес (кг):	Доза	Количество таблеток по 100 мг
1 кг	20 мг	Размешайте таблетку 100 мг в 10 мл воды, и сразу же дайте пациенту 2 мл полученной смеси
2 кг	40 мг	Размешайте таблетку 100 мг в 10 мл воды, и сразу же дайте пациенту 4 мл полученной смеси
3 кг	50 мг	0,5
4-6 кг	100 мг	1
7-9 кг	150 мг	1,5
10-12 кг	250 мг	2,0-2,5
13-15 кг	300 мг	3
16-18 кг	350 мг	3,0-3,5
19-20 кг	400 мг	4
21-23 кг	450 мг	4,0-4,5
24-25 кг	500 мг	5

МОКСИФЛОКСАЦИН, 100 МГ, С ЛИНИЕЙ РАЗЛОМА, ДИСПЕРГИРУЕМЫЕ ТАБЛЕТКИ

Рекомендуемые дозы: 10-15мг/кг/в день

Дозы в расчете на вес

Вес (кг):	Доза	Количество таблеток по 100 мг
1 кг	10 мг	Размешайте таблетку 100 мг в 10 мл воды, и сразу же дайте пациенту 1 мл полученной смеси
2 кг	20 мг	Размешайте таблетку 100 мг в 10 мл воды, и сразу же дайте пациенту 2 мл полученной смеси
3 кг	30 мг	Размешайте таблетку 100 мг в 10 мл воды, и сразу же дайте пациенту 3 мл полученной смеси
4-6 кг	50-80 мг	0,50-0,75
7-9 кг	150 мг	1,5
10-15 кг	200 мг	2
16-19 кг	300 мг	3
20-25 кг	400 мг	4

ЦИКЛОСЕРИН, 125 МГ, КАПСУЛЫ

Рекомендуемая доза: 15-20 мг/кг/в день

Дозы в расчете на вес

Вес (кг):	Доза	Количество таблеток по 125 мг
1 кг	20 мг	Размешайте капсулу 125 мг в 12 мл воды, и сразу же дайте пациенту 1 мл полученной смеси
2 кг	40 мг	Размешайте капсулу 125 мг в 12 мл воды, и сразу же дайте пациенту 2 мл полученной смеси
3-4 кг	62,5 мг	Размешайте капсулу 125 мг в 12 мл воды, и сразу же дайте пациенту 5 мл полученной смеси
5-9 кг	125 мг	1
10-15 кг	250 мг	2
16-23 кг	375 мг	3
24-25 кг	500 мг	4

ЭТАМБУТОЛ, 100 МГ, С ЛИНИЕЙ РАЗЛОМА, ДИСПЕРГИРУЕМЫЕ ТАБЛЕТКИ

Рекомендуемые дозы: 15-25 мг/кг/в день

Дозы в расчете на вес

Вес (кг):	Доза	Количество таблеток по 100 мг
1 кг	20 мг	Размешайте таблетку 100 мг в 10 мл воды, и сразу же дайте пациенту 2 мл полученной смеси
2 кг	40 мг	Размешайте таблетку 100 мг в 10 мл воды, и сразу же дайте пациенту 4 мл полученной смеси
3 кг	70 мг	Размешайте таблетку 100 мг в 10 мл воды, и сразу же дайте пациенту 7 мл полученной смеси
4-6 кг	100 мг	1
7-9 кг	200 мг	2
10-12 кг	250 мг	2,5
13-15 кг	300 мг	3
16-18 кг	350 мг	3,5
19-20 кг	400 мг	4
21-23 кг	450 мг	4,5
24-25 кг	500 мг	5

ПИРАЗИНАМИД, 150 МГ, С ЛИНИЕЙ РАЗЛОМА, ДИСПЕРГИРУЕМЫЕ ТАБЛЕТКИ

Рекомендуемые доза: 30-40 мг/кг/в день

Дозы в расчете на вес

Вес (кг):	Доза	Количество таблеток по 150 мг
1 кг	30 мг	Размешайте таблетку 150 мг в 15 мл воды, и сразу же дайте пациенту 3 мл полученной смеси
2 кг	60 мг	Размешайте таблетку 150 мг в 15 мл воды, и сразу же дайте пациенту 6 мл полученной смеси
3 кг	90 мг	Размешайте таблетку 150 мг в 15 мл воды, и сразу же дайте пациенту 9 мл полученной смеси
4-6 кг	150 мг	1
7-9 кг	225-360 мг	2
10-12 кг	375 мг	2,5
13-15 кг	450 мг	3
16-18 кг	525 мг	3,5
19-20 кг	600 мг	4
21-23 кг	675 мг	4,5
24-25 кг	750 мг	5

ЭТИОНАМИД, 125 МГ, С ЛИНИЕЙ РАЗЛОМА, ДИСПЕРГИРУЕМЫЕ ТАБЛЕТКИ

Рекомендуемая доза: 15-20 мг/кг/в день

Дозы в расчете на вес

Вес (кг):	Доза	Количество таблеток по 125 мг
1 кг	20 мг	Размешайте таблетку 125 мг в 12 мл воды, и сразу же дайте пациенту 1 мл полученной смеси
2 кг	40 мг	Размешайте таблетку 125 мг в 12 мл воды, и сразу же дайте пациенту 2 мл полученной смеси
3-4 кг	62,5 мг	0,5
5-6 кг	125 мг	1
7-9 кг	187,5 мг	1,5
10-13 кг	250 мг	2
14-15 кг	312,5 мг	2,5
16-20 кг	375 мг	3
21-23 кг	437,5 мг	3,5
24-25 кг	500 мг	4

ИЗОНИАЗИД, 100 МГ, С ЛИНИЕЙ РАЗЛОМА, ДИСПЕРГИРУЕМАЯ ТАБЛЕТКА

Рекомендуемые дозы: 15-20 мг/кг/в день

Дозы в расчете на вес

Вес (кг):	Доза	Количество таблеток по 100 мг
1 кг	15 мг	Размешайте таблетку 100 мг в 10 мл воды, и сразу же дайте пациенту 1,5 мл полученной смеси
2 кг	30 мг	Размешайте таблетку 100 мг в 10 мл воды, и сразу же дайте пациенту 3 мл полученной смеси
3 кг	50 мг	0,5
4-6 кг	100 мг	1
7-9 кг	150 мг	1,5
10-15 кг	200 мг	2
16-18 кг	250 мг	2,5
19-20 кг	300 мг	3
21-23 кг	350 мг	3,5
24-25 кг	400 мг	4

КЛОФАЗИМИН, ТАБЛЕТКИ 50 МГ

Доза: 2-5 мг/кг/в день

Вес (кг):	Доза (мг)	Количество таблеток по 50 мг
<5 кг	10-20 мг	Размешайте таблетку в 10 мл воды, чтобы получить суспензию 5мг/мл и давайте пациенту необходимую дозу. Не оставляйте суспензию для хранения, каждый раз делайте новую
6-10 кг	25 мг	½
11-19 кг	50 мг	1
20-25 кг	100 мг	2

ПОКА НЕТ В НАЛИЧИИ ЛИНЕЗОЛИД, 150 МГ, С ЛИНИЕЙ РАЗЛОМА, ДИСПЕРГИРУЕМЫЕ ТАБЛЕТКИ

**Доза: 10-12 мг/кг один раз в день детям < 12 лет, чей вес составляет 16 кг и больше;
15 мг/кг один раз в день детям < 12 лет, чей вес составляет менее 16 кг; 10 мг/кг раз в день детям, чей возраст составляет 12 и старше**

Вес (кг):	Доза	Количество таблеток по 150 мг
1 кг	15 мг два раза в день	Размешайте таблетку 150 мг в 15 мл воды, и сразу же дайте пациенту 1,5 мл полученной смеси
2 кг	30 мг раз в день	Размешайте таблетку 150 мг в 15 мл воды, и сразу же дайте пациенту 3 мл полученной смеси
3 кг	45 мг раз в день	Размешайте таблетку 150 мг в 15 мл воды, и сразу же дайте пациенту 4,5 мл полученной смеси
4 кг	60 мг раз в день	Размешайте таблетку 150 мг в 15 мл воды, и сразу же дайте пациенту 6 мл полученной смеси
5 кг	75 мг раз в день	Размешайте таблетку 150 мг в 15 мл воды, и сразу же дайте пациенту 7,5 мл полученной смеси или дайте половину таблетки 150 мг
6 кг	90 мг раз в день	Размешайте таблетку 150 мг в 15 мл воды, и сразу же дайте пациенту 9 мл полученной смеси
7-9 кг	75-150 мг раз в день	0,5-1
10-15 кг	150-225 мг раз в день	1-1,5
16-20 кг	225-300 мг раз в день	1,5-2
21-25 кг	300 мг раз в день	2



**Sentinel
Project**
on pediatric drug-
resistant tuberculosis

Stop TB Partnership
GLOBAL DRUG FACILITY